



# ט"ו בשבט ללא תולעים

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקה המזון כהלכה"

## מעודכן לשנת תשע"ח

### 1. פירות נקיים לא חיבים בדיקה מותלים

אבטיח	אתרגס מסוכר
אבוקדו	בננה
אגוד אורן (צנובר)	ברננה צ'יפס
אגוד ברזיל	דובדבנים מיובשים
אגוד מקדמיה	לאחרצנים
אגוד פקאן בקליפה	(תוצרת אה"ב בלבד)
אגס	חמציציות
אננס בשימוריים (בסירופ)	לדר (באריזה סגורה)

### 2. פירות שליעתיים נקיים טעונים בדיקה מותלים

ארגוני בклиיפות	הקשה (אגוד מלך, בונדוק)
ארגוני בונדוק קלופים ושקדים קלופים	בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורוי משי", פירותים כהים או זחלים בקליפה או על האגוז, ואם האגוז נראת מכורסם.
ארגוני פקאן קלופים	בודקים אותם משני צידיהם. אגוז בו נמצא "קורוי משי", סימני קרוסום או נקב, חווים ובודקים אותו מבפנים. אם נמצא גנייעות ודאיות, יש לחוץ ולבדוק את כלום מבפנים (גם אם לא נמצא גנייעות, טוב לחוץ כ-10% ולבדוק בפנים).
ארגוני מלך קלופים	בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורוי משי", תולעים או פירותים עגולים.
ארגוני מלח קלופים	מנעררים בהרע מסתנה בעלת חרומים גדולים על גבי משטה לבן ובודקים אם יש חריקים או תולעים בשנורת. בודקים את כל האגוזים משני צידיהם, ובפרט בפקלים, אם יש "קורוי משי", תולעים או סימני קרוסום.
ארגוני ושקדים קוצצים	מנעררים בהרע מסתנה רשת (מסנתת אורך) על גבי משטה לבן ובודקים אם יש חריקים קטנים בשנורת. שופכים את הנטורם במסנתה על משטה לבן ובודקים בין החתיקות.
ארגוני קשי	בודקים את כל האגוזים מבחוץ. אגוז מכורסם או מנוקב, חווים ובודקים אותו בין שני החזאים. אם נמצא גנייעות ודאיות, יש לחוץ את כלום. (מעט פירותים חומיים דקים בין החזאים הם שרויות הקליפה ולא גנייעות). [גם אם לא נמצא גנייעות, טוב לחוץ כ-10% ולבדוק בין שני החזאים].
ארגוני קפואות (מלח): רצוי לטוחו בבלנדר.	טריות: ראה ספר בדיקת המזון החקלאי, כרך ב'.
ארגוני מזונות	מיובשות: קשה לבודקם. לרכוש רק את המשווקות תחת כשרות מהודרת.
ארגוני אנונה	לקלף ולשטוף. לרוחס לפלהים ובודק אם מצויות ריקחות לבנות.
ארגוני אננס	טרוי: לקלף ולחשיר את כל החלילים החומיים המצויים תחת הקליפה. מיובש עם סוכר: להתבונן משני הצדדים אם נדקק עלי זבובן או חרב.
ארגוני אפרסמן	מיובש טבעי: לשבור לכמה חתיקות ולהתבונן היטב אם מצוי זחל או פירותים כהים עגולים בחילאים הקטנים שבבשר הפרי. משומר במיץ טבעי: עלול להיות נגעו, עדיף להשתמש בשימושו אגנס בסירופ.
ארגוני אפרסן	להויר את ה"עליה" (שבביב העזקץ) ולשטווף היטב. אם הפרי רך מאד, לבדוק מבפנים. אם מצוי כתם שחור על קליפת הפרי, מקלפים באותו מקום ומתבוננים אם מצוי שם רימות לבנות. (נקודות שחרות קטנות בבשר הפרי אין מהוות סיכון לנגיעה).
ארגוני גיאבה	בחזור פרוסות לרוחב הפרי, ולהתבונן היטב בכל פרושה משני צידיה אם מצוי רימה. צבע הרימות כבע הפרי (עם נקודה שחורה קטנה בראשון) וקשה לדוחה.
ארגוני דיזטים	שיטה חלופית: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אзор כהה רך במיוחד או נקב קטן. להחזר אזור זה ולהתבונן אם מצוי רימות בחור הפלר.
ארגוני דובדבנים	מסוכרים (לאחרצנים): לחוץ אחדים למדגום (כ-10%) ולבודק אם יש תולעת. אם נמצא גנייעות, יש לחוץ את כלום ולבודק מבפנים. בסייעתו: תוצרת אירופה: מתקיים - לפתח כל אחד ולבדוק. חומציות (כגון בהשגת הע"ח) - בחזקת נקי. תוצרת אה"ב: בחזקת נקיי.
ארגוני מושבש פירות	מיובשים עם החרצן (מצומקיטים): בדיקתם קשה ועדיין לא להשתמש. מיובשים (לאחרצן): תוצרת אה"ב בלבד. בחזקת נקיי.
ארגוני ענבים	יתים ירקום או מושחרים: אם יש כתם כהה, לחוץ ולהתבונן אם מצוי מחלת בתוך הדית. יתים שחורים: יש לחוץם ולבודקם מבפנים אם מצוי מחלת או תולעת. טבעות זיתים (ירוקים או מושחררים): לשוט על צלחת וכדומה ולהתבונן אם מצוי מחלת או תולעת.
לדר לא ארזה	להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובן או נמל.
משמש מושבש פירות	פרי שלם: לחוץ ונבדוק כנגד האור משני הצדדים. פרי הנמוך חצוי: להשרות בפחים פושמים, לפתח את הקפלים ולבודק כנגד האור.
פירות מושבשים	1. מחלקים את האשכולות הצפויים לחילוקים קטנים. משרים את הענבים במים עם מעט סבון נוזלי ושוטפים היטב במים זורמים. רצוי להזכיר על ההשריה והשטייפה שלוש פעמים. 2. מסתכלים על כל עינב. אם רואים כתם כהה החודר לתוך העינב, חותכים שם ובודקים אם יש תולעת בתחום.
פירות מושבשים בклиיפות הקשה	לחוץ ולבודק מבפנים אם מצוי תולעת או פירותים כהים, (אפשר לבדוק גם אחרי הבישול).
פירות מושבשים:	להתבונן משני הצדדים אם נצמד זבובן או חרב. רצוי לשטווף.
קיווי	פנים הפרי בחזקת נקי. לעתים רוחקות מצויות נקיות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזכיר שלא תעבורנה לפרי בעת הקילוף, או לשטווף את הפרי המוקולף.

המשך ←

לע"ג הר"ר אברהם חיים בן הר"ר יצחק ע"ה    לע"ג מרთ יראת קיילא הוה בת הר"ר חיים הכהן ע"ה    לע"ג הרב אליעזר משה בן שלמה סאקס ע"ה  
מוחור לשכפל ולהפיץ דף זה לייכוי הרבים מבלי לשונתו. ניתן להציג בטלי' 9766653-08 או בדוא"ל: teva.ramot@gmail.com • vayemoshe@gmail.com

<p>להתבונן אם מצוי נקי בקיליפה. בעת פירוק הגרגירים יש להתבונן אם מצויות רימות לבנות קטנות או תולעת חומה בין הגרגירים.</p>	<b>רימון</b>
<p>לפתחו ולבדק את ה"כתר" שבתחתי הפה, אלוו עלולים לחדר חרקים קטנים.</p>	<b>שק</b>
<p>ראה אגוזים.</p>	<b>שקדמים</b>
<p>לחצות בסכין, להוציא את הנעלין ולבדק משני הצדדים כנגד האור (לחפש חרק כהה בגודל 3-2 ס"מ או תולעת בערך כ-2 ס"מ מ"מ או מושחת וכחיה).</p>	<b>תמר</b>
<p>בדרכ כל נקע, טוב לחצותו ולבדוקו.</p>	<b>תמר לח (קפוא)</b>
<p><b>ngeiutot chizionit:</b> מציה בכל פירות החדר על הקיליפה מצויות כינימות בצעב חום או אפור כהה. לאחר הקילוף והחיתוך יש לבדוק שהכינימות לא נצמדו לפורי, וכן שלא עברו מהיד לפורי וכן או לשטוף היטב את הפורי אחריו הקילוף. אם רוצחים להשתמש בקיליפה - לשפשף במברשת קשה או בכירית מותכת ('גנס') עם נוזל לניקוי כלים, לשטוף ולבדק שלא נותרו כינימות.</p> <p><b>ngeiutot panimiyot:</b> עלולה להימצא בתפוזים, קלמנטיינות ואשכוליות על להיות נבעו בירימות לבנות. נגיוטות זו נדרה כאשר הפרודטים מטופלים היטב, בפרט בעונת החורף. פירות מעצים לא מטופלים כגון פרטית, או מערבים בשנת שמשה וכן פירות בעונת הקיץ עלולים להיות נגועים יותר.</p> <p>א. בעת הקילוף, יש לעיין בצד הלבן של הקיליפה אם ישנו כתם חום או אדורך במיוחד הנמשך לתוך פנים הפורי, ולאחר מכן אם יש חדירה של רימות במקום זה.</p> <p>ב. אם הפורי רך במיוחד או בעל צבע וריח שונה, יש לבדוק את פנים הפלחים. אם נמצא פרי נגוע, יש לבדוק היטב את כל הפירות מאותו קנייה.</p> <p><b>מייצ' הדרים - סחות בית:</b> מנקיים את הפירות בכירית מותכת ונוזל לניקוי כלים לפני הסחיטה, כדי למנוע חדירת כינימות למיצ'. לחילופין, ניתן לسان דריך מסננת צפופה לאחר הסחיטה.</p> <p><b>סחות טבי מטבח:</b> יש לסנן את המיצ' במסננת צפופה.</p>	<b>הדרים:</b> <b>תפוז, קלמנטינה, לימון, אתרוג, פומלה, אשכולית, פומליית</b>
<p><b>פירוחים:</b> גרעיני דלעת: <b>עם קיליפה (לבנים):</b> בדרך כלל נקיים. אם הקיליפה פגומה, יש לקלף ולבדוק. <b>קלויפים (ירוקים):</b> לנער במסננת ירקות על גבי משטה לבן ולבדוק אם נפלו תולעים על המשטה. אם נמצא תולעים, אין להשתמש.</p> <p>גרעיני אבטיח: לפתחו ולבדוק מדגם של כ-10%. אם נמצא גניוטה, יש לפתחו ולבדוק את כולם.</p> <p>גרעיני חמניות: <b>עם קיליפה (שחורים):</b> ציריך לקלף כל אחד ולבדוק את כלם.</p> <p><b>קלויפים (אפור בהיר):</b> א. לנער במסננת של אוזר על גבי משטה לבן ולהתבונן אם נשרו חרקים קטנים על המשטה. ב. לפזר את הגרעינים על משטה לבן ולבדוק בינם, אם נמצא תולעים – אין להשתמש.</p> <p><b>בוטנים:</b> לבדוק את כולם מכחוץ. בוטן בו נמצאו חורים, סימני קרוסום או סימן של חידרת תולעת, חוץים ובודקים אם יש בו נגיוטות פנימית. אם נמצא סימני נגיוטות ודאית, יש להחצות את כולם ולבדוק מבפנים. גם אם לא נמצא גניוטה, טוב לחצות כ-10% ולבדוק בפנים.</p> <p><b>בוטנים טחוניים:</b> ראה אגוזים קצוץים.</p> <p><b>בוטנים מצופים (קובוקים, מצופים שוקולד וכדומה):</b> לפתחו כ-10%, אם נמצא גניוטה – לפתח את כולם.</p> <p><b>בוטנים בקיליפתם הקשה:</b> ראה אגוזים בקיליפתם הקשה.</p> <p><b>פיסטוקים:</b> מקלפים ומתחובנים חיזוניים אם יש "קוורי מש"י" או זחלים. פיסטוק עליו נראו סימני גניוטות, חוץים ובודקים אם יש בו גניוטות פנימית. אם נמצא גניוטות ודאית, יש להחצות את כל הפיסטוקים ולבודק מבפנים. [גם אם לא נמצא גניוטה, טוב לחצות כ-10% ולבדוק בפנים].</p>	<b>פירוחים</b>

### 3. פירות הנגועים לעיתים קרובות בתולעים מוחזק כרגע

<p>מציה בהם נגיוטות גבוהה ואין שיטה בטוחה לנקוטם.</p>	<b>היביסוקס</b>
<p>חוושים תוצרת הארץ החזים את הפורי ובודקים אם מצוי דחל או מחילה עם פירורים כהים ומוסרים את האזורה הנגוע.</p>	<b>חוושים</b>
<p>לשטווף היטב, לשבור לחטיפות קטנות (2 ס"מ) ולבדוק אם מצוים פירורים, קוורי משי או תולעים וחוקים.</p>	<b>חרובים</b>
<p>נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מללאולו.</p>	<b>פטל</b>
<p>עקב נגיוטות חיזונית המציה בציגוקים, כולל צימוקים מקיליפורניה, מומלץ להשתמש בחומוצאות, כחהיליףיעיל לצימוקים. בצדיה ורוצחים להשתמש בציגוקים, יש עדיפות להשתמש בציגוקים שעברו בבדיקות מדגימות, כגון צימוקים שהבשחתה בערך העדה החרדית, אותן יש לבדוק בדיקה יסודית כדלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>להשרות את הצימוקים במים חמים לצלחת לבנה ולהתבונן אם מצוים תולעים או חרקים חומיים במים.</li> <li>להעביר את המים הקרים לצלחת לבנה ולהתבונן אם מצוים תולעים או חרקים חומיים במים.</li> <li>אם לא נמצא גניוטה – לשטווף היטב את הצימוקים תחת זרם מים חזק.</li> </ol> <p><b>צימוקים מיצור בית.</b> ניתן להרכיב צימוקים נקיים בתנור בית. ראה הוראות בספר בדיקת המזון כהלהה ח'ב.</p>	<b>צימוקים</b>
<p>נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מללאולו.</p>	<b>תות עץ</b>
<p>קיימות נגיוטות כל-עולמית של "טריפסים" קטנים המסתתרים בשקעים של התותים ואינם יורדים בשיטופות הרגילות; אך מומלץ לאכול תותים רק לאחר ניקויים באחד משני האופנים:</p>	<b>תות שדה</b>
<p><b>אוף א:</b> לחזור בסכין את העלה הירוק עם שכבה דקה מהפה ולהסיר סדקם, חריצים עמוקים או איזוריים פגומים. להשרות במים עם מעט סבון נוזלי למשך 3 דקות, לשפשף מעט בתוך המים, ולשטוף היטב (בכל פעם מעט תותים) תחת זרם מים חזק באופן שהחומר יגיעו לכל הצדדים. יש לחזור על השטיפה וההשריה שלוש פעמים ולאחר מכן לבלשל.</p>	<b>אוף ב:</b> לקלף שכבה דקה מהפה מכל צדדיו (כל שכבה החיזונית כולל חריצים עמוקים ומוקם חיבור העלה) ולשטוף במים לאחר הקלוף.
<p><b>תות שדה מסוכר</b> (מיובש עם סוכר): בחזקת נקי.</p>	<b>תות גוג'</b> (גוג' ברי – מוצר בריאות, הנמכר בحانניות טבע)
<p>מציה בהם נגיוטות גבוהה ואין שיטה בטוחה לנקוטם.</p>	<b>תאנים</b>
<p>נגועוון גבויה ובודקן קשה ומורכבת.</p>	<b>טריות ומובישות</b>

מענה לשאלות בטל' 5325588-02 בוקר ובערב בשעה 12:00-10:00 ובימים שישי משעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסה שבת.  
ניתן להאזין לשיעורי הרוב ויא שליט' א"ב"kol הלשון" טל' 09-6171039-03 • לצפייה באתר: [www.kolhalashon.com](http://www.kolhalashon.com)