


דף מידע - רימות זבוב הבשר

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקת המזון כהלכה"
מעודכן לשנת תשע"ט



FLY MAGGOTS

רימות זבובים במזון מן החי

הנגיעות

זבובים עלולים להטיל ביצים או להשריץ רימות על מזון מן החי, כגון: בשר, דגים, ביצים וגבינות.

תיאור הנגיעות




זבוב ירוק




זבוב כחול



זבוב השחמט



רימות זבוב בשר



479א. רימות זבוב הבשר על פיסת דג בקלה (מוגדל 3x).

רימות זבוב הבשר FLESH FLY MAGGOTS
קיימים סוגים שונים של זבובי בשר: זבובים שצבעם ירוק או כחול מתכתי ואורכם 12 מ"מ; וכן זבובים גדולים המכונים "זבוב השחמט", שגופם אפור-שחור משובץ, בודמה ללוח שחמט ואורכם כסנטימטר וחצי. הזבובים נמשכים לבשר ולדגים (מבושלים או לא מבושלים) ולעיתים גם לגבינות ולביצים סדוקות או פתוחות, ואפילו לחביתה.


ישנם זבובים המשריצים מגופם עשרות רימות חיות וישנם זבובים המטילים עשרות ביצים על הבשר או הדג.

הביצים נראות כגרעיני אורז זעירים, שאורכם 1-2 מילימטרים והן צמודות זו לזו כאשר זעיר, (תמונות 477, 479ב). מספר שעות לאחר ההטלה בוקעות מהביצים רימות קטנות, החודרות לתוך הבשר.

האורך ההתחלתי של הרימות הוא כ-2 מילימטרים. הן גדלות במהירות ותוך שבוע מגיעות לאורך 18 מילימטרים. צבען לבן ונקודה שחורה זעירה בראשן, (תמונה 479א). בדרך כלל מוטלות עשרות ביצים או רימות בהטלה אחת, (תמונות 479ב).

הבדיקה

יש להקפיד לכסות היטב מזון מן החי, בין מבושל בין לא מבושל, או לאחסנו בקירור. בשר שנשמר כראוי, אין לחשוש לנגיעות ואין צורך לבדוקו. אם מבחינים בביצי זבוב על הבשר, יש להסיר ולשטוף היטב את הבשר. אם מבחינים ברימות זבוב בבשר, אין להשתמש באותה חתיכת בשר היות והרימות חודרות לתוך הבשר פנימה.



479ב. שלבי ההתפתחות של הזבוב (מוגדל):

1. ביצים. 2. רימה צעירה. 3. רימה בוגרת. 4. גולם. 5. זבוב בוגר.



479ג. אשכול ביצי זבוב הבשר על בשר. העיפרון להמחשת גודלם של הביצים. בריבוע משמאל: הביצים בהגדלה.